UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ HƯƠNG KHÊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:2127 /UBND-TTDVTH Về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ đông 2026	*Hương Khê, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Trưởng thôn các thôn;
- Ban Công tác Mặt trận các thôn.

Để chủ động phòng trừ sâu bệnh, hạn chế thiệt hại do các đối tượng sinh vật gây hại gây ra, đồng thời chăm sóc cây ngô đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm sinh trưởng và năng suất, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đề nghị Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận các thôn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân triển khai thực hiện tốt một số biện pháp sau:

1. Đối với cây ngô

1.1. Biện pháp chăm sóc

- Tiến hành làm cỏ, xới đất, kết hợp bón thúc lần 1. Có thể sử dụng phân NPK 16-16-8 hoặc NPK 15-15-15, với lượng từ 7–10 kg/sào. Khi bón, rải phân quanh gốc, cách gốc 5–7 cm, sau đó vun nhẹ đất quanh gốc để lấp phân, tạo độ thông thoáng, kích thích bộ rễ phát triển.
- Đối với những diện tích ngô có biểu hiện vàng lá, bộ rễ còn yếu, có thể bổ sung phân bón lá (Siêu lân, Humic...) nhằm hỗ trợ cây phục hồi và tăng khả năng sinh trưởng.

1.2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, xác định đúng đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

a) Đối với sâu keo mùa thu

Khi mật độ sâu đạt từ 2 con/m² trở lên, cần tiến hành phòng trừ bằng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật sau:

- Thuốc Voliam Targo 063SC: Sử dụng 15 ml pha với 20 lít nước, phun cho diện tích 500 m².
- Thuốc Hagold 75WG (nhãn hiệu Vua Rồng): Sử dụng 1 gói 10 g kết hợp với 1 gói chất bám dính 10 ml, pha với 16–18 lít nước, phun cho diện tích 500 m².
- Thuốc Proclaim 5WG: Sử dụng 1 gói 15 g pha với 16–18 lít nước, phun cho diện tích 500 m².
- Để nâng cao hiệu quả phòng trừ, cần phun thuốc khi sâu còn ở tuổi 1–2; tập trung phun vào nõn ngô, bảo đảm thuốc tiếp xúc tốt với vị trí sâu cư trú. Sau khi phun 4–5 ngày, tiến hành kiểm tra lại đồng ruộng; trường hợp sâu vẫn còn mật độ cao, cần căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn sử dụng thuốc để có biện pháp xử lý tiếp theo.

b) Đối với bệnh đốm lá

Bệnh thường xuất hiện trước tiên trên các lá già sát gốc, sau đó lan dần lên các lá phía trên. Ban đầu, vết bệnh là những đốm nhỏ, dạng ngậm nước; sau đó lớn dần, có dạng sọc hoặc hình thoi, màu nâu hoặc xám bạc. Vết bệnh có kích

thước rộng khoảng 1–2 mm, dài 5–10 mm. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, bệnh phát triển nhanh, làm cây còi cọc. Khi bị bệnh nặng, các vết bệnh liên kết với nhau khiến toàn bộ phiến lá bị khô, héo và giòn, làm giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Biện pháp phòng trừ:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện bệnh; tiến hành vệ sinh đồng ruộng, loại bỏ các lá già, lá bị bệnh nặng.

- Khi bệnh xuất hiện và có nguy cơ lây lan, có thể sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật như: Anvil 5EC, Tilt Super 300EC, Athuoc Top 480SC, Vida 5WP... Việc sử dụng thuốc phải tuân thủ đúng hướng dẫn trên nhãn và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. Đối với nhóm sâu ăn lá trên cây rau

Hiện nay, trên các diện tích rau đã xuất hiện một số đối tượng sâu ăn lá gây hại, chủ yếu gồm:

a) Sâu tơ

Là đối tượng sâu hại nguy hiểm đối với các loại rau thuộc họ hoa thập tự. Sâu gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng của cây rau, đặc biệt gây hại nặng ở giai đoạn cây mới trồng. Khi mật độ sâu cao, sâu có thể ăn gần hết diện tích phiến lá, chỉ để lại gân lá, làm giảm năng suất, chất lượng rau và tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh thối nhũn phát sinh, gây hại.

b) Sâu khoang

Là loài sâu đa thực, gây hại trên nhiều loại cây rau. Sâu có thể gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, thường phát sinh ngay từ đầu vụ. Sâu hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều mát; khi mật độ cao, sâu ăn khuyết lá, trụi lá, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và năng suất cây trồng.

c) Sâu xanh bướm trắng

Đối tượng này gây hại chủ yếu trên các loại rau thuộc họ hoa thập tự như su hào, bắp cải, súp lơ... Sâu thường phát sinh, gây hại từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, sâu non tập trung gây hại nặng trên những ruộng rau xanh tốt. Vì vậy, cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

d) Biện pháp phòng trừ nhóm sâu ăn lá trên rau

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu hại, nhất là khi sâu còn ở tuổi 1–2 để tổ chức phòng trừ kịp thời.

- Có thể sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật như: RHOLAM Super 100WG, Trebon 10EC, Tasieu 5WG, Reasgant 3.6EC, Match 050EC...

- Đối với sâu khoang, cần chú trọng các biện pháp thủ công như ngắt bỏ ổ trứng, thu gom và tiêu diệt sâu non mới nở khi sâu chưa phát tán rộng.

- Đối với sâu tơ, sâu xanh và sâu khoang, cần chú ý luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế tình trạng sâu kháng thuốc, nâng cao hiệu quả phòng trừ.

3. Một số lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, thực hiện nghiêm nguyên tắc **4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách)**; bảo đảm thời gian cách ly trước khi thu

hoạch. Đồng thời, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và thực hiện thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định, tuyệt đối không vứt bao bì thuốc ra đồng ruộng, kênh mương hoặc nguồn nước.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đề nghị Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận các thôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân chủ động kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nêu trên. Khi phát hiện sâu bệnh gây hại hoặc có diễn biến bất thường, kịp thời thông tin về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã *(đồng chí Lê Thị Tuyết, số điện thoại: 0979.432.986)* để được kiểm tra, hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

Đề nghị Trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận các thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Phòng Kinh tế;
- Chánh, PVP HĐND và HĐND xã;
- Lưu: VT. TTDVTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường Thọ